A , a a a a a a .

A a , a a , a , a a , a a , a a , a a , a , , , a . : 1) E a ; 2) a a a a 24 a a a a a a a a a a a a a I a a ; 3) a a a a Da A (DA); a 4) a a a a a a a a a .

A a a a a , a a a L a a (L) a a a B (B) (a a a a a) a a a a a a a a KA. A a a a Da A (DA) a (a a , , a a a) a a a - . A a , a a a a (a a 0 -2 a a 0 , -100 ,), a a a a (a 1% 0 -10). A a a a a a a a a a . A a , 20 0.325% a a a a 0.5% a a a a a a .

a a a a (a a a a a) a KA). A , a a . A a a a , a a a a (a , a a , , .) LA (L a A). LA a a a a - a a a a 9,10 .

a a , a , , , a , a a , a a , a , a a , (a , a a), a (0= a 10= a), a a a (a E a (ME)) . a a a a a a a a a a a a a a a D M a (DM).

(a) a a . LA a a a a a , a a a a LA a a a . a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 30 a a . D a a a a (0= a a 10= a), a ME a a . Ba a a a . C a a a , a a D a (D), a a a a a a a . D K a - a a a a a a a F , a . C a a a . M a a a a a a a a a a a . Da a a a a a a a D a (D).

a 1 a a a a - a a a a . a - a . a a a a a a a a (60), a a a a (42), a (24), a a (28), (6), a a a (12), a a (3), a a a (9). B 159 a . 114 a a (113 L a 2 B; 99 a a a 16 a a), 45 a a (4 B, 37 L, a 3 a a a). - a a a 13 a a . - a a . a 2 a a .

No % (n)	62.5 (115)	56 (14)	57.8 (26)	65.8 (75)
Yes % (n)	37.5 (69)	44 (11)	42.2 (19)	34.2 (39)
No % (n)	72.8 (134)	60 (15)	73.3 (33)	75.4 (86)
Yes % (n)	27.2 (50)	40 (10)	26.7 (12)	24.6 (28)
No % (n)	72.8 (134)	64 (16)	66.7 (30)	77.2 (88)
Yes % (n)	27.2 (50)	36 (9)	33.3 (15)	22.8 (26)
No % (n)	83.7 (154)	72 (18)	84.4 (38)	86 (98)
Yes % (n)	16.3 (30)	28 (7)	15.6 (7)	14 (16)
Mean (SD)	4.73 (3.56)	4 (3.6)	4 (3.3)	5.2 (3.6)
Mean (SD)	3.42 (3.01)	2.4 (2.4)	2.2 (2.4)	4.1 (3.2)
Mean (SD)	2.72 (2.69)	1.8 (2)	2 (2.2)	3.2 (2.9)
Mean (SD)	51.87 (116.36)	63.9 (246.5)	20.9 (38.2)	61.5 (89.2)
No % (n)	41.3 (76)	40 (10)	46.7 (21)	39.5 (45)
Yes % (n)	58.7 (108)	60 (15)	53.3 (24)	60.5 (69)
Opioid prescription f lled at discharge				
No % (n)	17.6 (19)	6.7 (1)	16.7 (4)	20.3 (14)
Yes % (n)	82.4 (89)	93.3 (14)	83.3 (20)	79.7 (55)
Opioid re f ll w/in 30 days after discharge				
No % (n)	39.7 (73)	40 (10)	44.4 (20)	37.7 (43)
Yes % (n)	60.3 (111)	60 (15)	55.6 (25)	62.3 (71)

Demographics, preoperative and postoperative characteristics are listed according to whether the subjects received no block, a unilateral block or a bilateral block.

Inguinal hernia repair	60 (20)*	9	51 (20)*	37 (13)*	14 (7)*
Ventral and/ or umbilical hernia repair	42 (5)*	4	38 (5)*	0	38 (5)*
	(1)§		(1)§		(1)§
Nephrectomy	24 (3)§	1	23 (3)§	4 (4) §	19 (1)§
Prostatectomy	28 (1*)	0	28 (1)*	0	28 (1)*
Cystectomy	6 (1)§	0	6 (1) §	0	6 (1) §
TKA	3	0	3	3	0
Foot and ankle surgery	9	9	0	0	0
Other	12 (4)*	2	10 (4)*	0	10 (4)*
(*) number of blocks performed with ropivacaine; (§) number of PVBs.					

Types of surgeries performed on patients who received Zynrelef® and the type of nerve block (if any) that they received.

a 3 a a a a - a a a a a . A a 95 a a a , 75 a 1 (a) a 20 2 ( ). a a (ME) a a (1.9 2.30 *vs.* 1.65 1.87; =0.467 a 9.75 12.74 *vs.* 10.32 12.92 ; =0.861,). a a a 45% 1 *vs.* 40% 2 (=0.617). A a a a , 71% a 1 *vs.* 2 (28% 1 *vs.* 8 % 2; =0.574).

			(n=20)
Mean (SD)	61.37 (16.35)	63.7 (15.7)	52.8 (16.4)
Mean (SD)	175.09 (11.41)	176.8 (10.8)	168.6 (11.5)
Mean (SD)	84.55 (17.92)	86 (16.3)	79 (22.5)
Mean (SD)	27.23 (5.24)	27.2 (4.8)	27.2 (6.8)
Female % (n)	20 (19)	9.3 (7)	60 (12)
Male % (n)	80 (76)	90.7 (68)	40 (8)